

# $\mathbb{Q}$ , los racionales, no es completo.

Septiembre 7, 2007.

No es muy difícil demostrar que cada uno de los axiomas de campo y los axiomas de orden por los cuales introdujimos a los números reales,  $\mathbb{R}$ , son también válidos en el conjunto  $\mathbb{Q}$  de todos los números racionales. El único de los axiomas con que presentamos a  $\mathbb{R}$  que no es válido en  $\mathbb{Q}$  es el importante Axioma del Supremo.

En esta nota se presenta un subconjunto acotado de  $\mathbb{Q}$  que carece de supremo en  $\mathbb{Q}$ . Para entender mejor esto, se le pide al lector que piense por un momento que solamente existen números racionales, definiremos el conjunto y trabajaremos siempre cuidando que solamente se ocupen conceptos que puedan ser definidos en el sistema de los números racionales.

Empecemos por definir al conjunto:

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}.$$

Es bastante claro que este conjunto no es vacío (cero es uno de sus elementos) y está acotado superiormente (100 es una de sus cotas superiores).

Primero veamos que ningún  $u \in \mathbb{Q}$  tal que  $u^2 > 2$  puede ser la mínima cota superior del conjunto  $A$ . En efecto, como  $u^2 > 2$ , entonces

$$u = \frac{u^2}{u} = \frac{u+u}{2} = \frac{u + \frac{u^2}{u}}{2} > \frac{u + \frac{2}{u}}{2}.$$

Además

$$\left(\frac{u + \frac{2}{u}}{2}\right)^2 = \frac{u^2 + 4 + \frac{4}{u^2}}{4} = \frac{u^2 + \frac{4}{u}}{4} + 1.$$

Por otro lado

$$\left(\frac{u - \frac{2}{u}}{2}\right)^2 = \frac{u^2 - 4 + \frac{4}{u^2}}{4} = \frac{u^2 + \frac{4}{u}}{4} - 1,$$

por lo que

$$\left(\frac{u + \frac{2}{u}}{2}\right)^2 = 2 + \left(\frac{u - \frac{2}{u}}{2}\right)^2.$$

Puesto que  $\left(\frac{u - \frac{2}{u}}{2}\right)^2 \neq 0$  (puede el lector demostrar por qué) se tiene en consecuencia que

$$\left(\frac{u + \frac{2}{u}}{2}\right)^2 > 2.$$

Es decir, si  $u$  es cota superior del conjunto y  $u^2 > 2$ , entonces  $\frac{u + \frac{2}{u}}{2}$  también es cota superior de nuestro conjunto y  $\frac{u + \frac{2}{u}}{2} < u$ .

Finalmente veamos que si  $v \in A$  y  $v \geq 1$  entonces  $v$  no es cota superior de  $A$ . La idea en este caso es escoger  $n \in \mathbb{N}$  suficientemente grande de modo que  $\left(v + \frac{1}{n}\right)^2 < 2$ ; de este modo  $v + \frac{1}{n} \in A$  y es mayor que  $v$ .

Sabemos que

$$\left(v + \frac{1}{n}\right)^2 = v^2 + \frac{2v}{n} + \frac{1}{n^2}.$$

Hagamos  $\varepsilon = 2 - v^2 > 0$ . Entonces si escogemos  $n \in \mathbb{N}$  tal que

$$\frac{2v}{n} < \frac{\varepsilon}{3}$$

y

$$\frac{1}{n^2} < \frac{\varepsilon}{3},$$

se tendría que  $\left(v + \frac{1}{n}\right)^2 < v^2 + \frac{2\varepsilon}{3} < 2$ . Para lograr esto necesitamos que

$$3(2v) < n \cdot \varepsilon \tag{1}$$

y

$$3 < n^2 \cdot \varepsilon. \tag{2}$$

Como estamos suponiendo que  $v \geq 1$ , la desigualdad (1) implica la desigualdad (2). Por lo tanto necesitamos únicamente escoger  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $3(2v) < n \cdot \varepsilon$  que existe por la Propiedad Arquimediana<sup>1</sup>.

En uno de los ejercicios se pide demostrar que  $\sqrt{2}$  no es un número racional. Como una sugerencia, razone por contradicción y empiece por escribir a  $\sqrt{2}$  como una fracción irreducible.

---

<sup>1</sup>Aquí nos referimos a la versión en  $\mathbb{Q}$  de dicha propiedad. Es posible hacer una demostración de ella que solamente use elementos emanados de  $\mathbb{Q}$ . El lector interesado puede consultar: F. Hernández Hernández, *Teoría de Conjuntos, una introducción*. Volumen 13 de la Serie Textos de Aportaciones Matemáticas. Sociedad Matemática Mexicana. México 2003.