

CAPÍTULO 1

Bases de Hamel para los números reales, \mathbb{R}

Carlos Eduardo Cervantes Tlatempa,
Alexis Chávez Cortés y Fernando Hernández Hernández
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México

1. Introducción

Obviamente, la primera estructura matemática importante que conocemos es el sistema de los números reales. Muchos de nosotros creemos, de manera algo ingenua, que los comprendemos desde los primeros años, pero con el tiempo nos damos cuenta de todo lo que realmente desconocemos sobre los números reales, \mathbb{R} . La segunda estructura significativa que encontramos es la de un espacio vectorial, muy ligada, por cierto, a los números reales. Los cursos elementales de álgebra lineal se centran principalmente en espacios vectoriales de dimensión finita sobre el campo de los números reales (o de los números complejos, \mathbb{C}). Pocas veces se nos habla de un espacio concreto de dimensión infinita: por ejemplo, los números reales, \mathbb{R} , como espacio vectorial sobre el campo de los números racionales, \mathbb{Q} .

En esta nota, presentamos algunos aspectos que consideramos interesantes sobre el hecho de que los números reales son un espacio vectorial sobre los números racionales. Todos los resultados presentados se pueden encontrar en algún lugar de los textos citados al final en la bibliografía. La segunda sección comienza de manera muy elemental, presentando algunas aplicaciones inmediatas y diferentes bases algebraicas para los números reales como espacio vectorial sobre los racionales; es decir, bases con diversas propiedades que suelen aparecer en el estudio topológico o analítico. La tercera sección aborda bases algebraicas para otros espacios vectoriales, y en la cuarta sección presentamos una base algebraica conexa de un espacio popular. También incluimos un Apéndice que complementa el teorema de Erdős y Kakutani, teorema 2.6.

Hemos tratado de hacer esta nota autocontenida en su mayor parte, del lector solamente suponemos cierta madurez matemática y conocimientos básicos de álgebra lineal, cálculo, topología y los principales aspectos de teoría de conjuntos. Nuestra notación es la usual a la de textos que tratan con nociones topológico conjuntistas. Por ejemplo, nosotros denotamos al conjunto de los números naturales indistintamente por \mathbb{N} o por el símbolo del primer ordinal infinito, ω . Para nosotros los números ordinales son conjuntos bien ordenados cuyos elementos son los números ordinales más pequeños. Con esta idea en mente, se puede pensar que la Hipótesis del Continuo es la afirmación de que existe una biyección (y por lo tanto una enumeración) entre \mathbb{R} y ω_1 , el primer ordinal no numerable. En otras palabras, CH dice que es posible considerar una enumeración $\{x_\alpha : \alpha < \omega_1\}$ de \mathbb{R} , de modo tal que para cada $\beta < \omega_1$ se tiene que $\{x_\alpha : \alpha < \beta\}$ es un conjunto numerable (o sea, biyectable con \mathbb{N}).

2. \mathbb{R} tiene dimensión infinita sobre \mathbb{Q}

Como es bien sabido, si F es un campo, entonces un *espacio vectorial* sobre F es un conjunto V , con una operación binaria (suma) que lo convierte en un grupo abeliano; además hay una *multiplicación por escalar*; es decir, hay una función con dominio $F \times V$ y rango contenido en V ; o sea que es una función, $\langle s, v \rangle \mapsto s \cdot v \in V$, la cual tiene las siguientes propiedades: para cualesquiera $v, w \in V$ y cualesquiera $s, t \in F$: $1_F \cdot v = v$, $(s \cdot t) \cdot v = s \cdot (t \cdot v)$, $s \cdot (v + w) = s \cdot v + s \cdot w$ y $(s + t) \cdot v = s \cdot v + t \cdot v$. Entonces es muy fácil convencerse de que si tomamos a $F = \mathbb{Q}$ y a $V = \mathbb{R}$, obtenemos un espacio vectorial sobre el campo \mathbb{Q} de los números racionales. También, si tomamos a $F = \mathbb{R}$, claramente $V = \mathbb{R}$ es un espacio vectorial sobre \mathbb{R} que tiene dimensión 1.

El matemático alemán Georg Hamel, en 1905, publicó un artículo titulado «Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung $f(x + y) = f(x) + f(y)$ » («Una base de todos los números y las soluciones discontinuas de la ecuación funcional $f(x + y) = f(x) + f(y)$ »), donde introdujo formalmente el concepto de lo que hoy se conoce como base de Hamel.

En su artículo, Hamel mostró que cualquier espacio vectorial tiene una base, siempre y cuando se acepte el Axioma de Elección, un principio fundamental tanto para la teoría de conjuntos como para muchas otras ramas de las matemáticas. Algunas equivalencias del Axioma de Elección son el lema de Kuratowski-Zorn y teorema del Buen Orden, el teorema de Tychonoff para el producto de espacios compactos, etc. También se demostró que el hecho de que todo espacio vectorial tenga una base de Hamel es igualmente equivalente al Axioma de Elección. Sin embargo, que \mathbb{R} tenga una base de Hamel como espacio vectorial sobre \mathbb{Q} es una afirmación más débil que el Axioma de Elección. Por ejemplo, es relativamente consistente ZF más el Axioma de Elecciones Dependientes más el hecho de que \mathbb{R} tenga una base de Hamel sobre \mathbb{Q} ; pero que aún así \mathbb{R} no tenga un buen orden. Remitimos al lector interesado en esta afirmación a [SWY].

Como primer instancia para mostrar enormes diferencias a lo acostumbrado en los cursos elementales de álgebra lineal, probaremos que la dimensión de \mathbb{R} como espacio vectorial sobre \mathbb{Q} es infinita. Supongamos lo contrario, digamos que $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = n$, para algún $n \in \omega$. Consideremos el número de Euler, e , y el conjunto $\{1, e, e^2, \dots, e^n\}$ que es linealmente dependiente (teorema 5.1, capítulo 3, [Lan]). Así existen números racionales (algunos distintos de cero) $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Q}$, tales que

$$a_0 + a_1 e + a_2 e^2 + \dots + a_n e^n = 0.$$

Pero se sabe que e es un número trascendental (teorema 2.1, capítulo 2, [PS]). Así tenemos que $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \neq n$ para todo $n \in \omega$. Por lo tanto el espacio vectorial de números reales sobre el campo de los números racionales no es de dimensión finita.

Ahora probaremos que la dimensión de \mathbb{R} como espacio vectorial sobre \mathbb{Q} es de hecho la máxima posible, \mathfrak{c} .

Si H es una base para \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} , note que el conjunto

$$B = \{h_0 q_0 + \dots + h_n q_n : n \in \omega \wedge (\forall i \leq n)(h_i \in H \wedge q_i \in \mathbb{Q})\}$$

de todas las combinaciones \mathbb{Q} -lineales finitas de elementos de H tiene la misma cardinalidad que H puesto que¹

$$|B| = |[H]^{<\omega} \times [\mathbb{Q}]^{<\omega}| = |H \times \mathbb{Q}| = |H|.$$

Ya que H genera a \mathbb{R} , se sigue que $|H| = \mathfrak{c}$.

Como una primera aplicación trivial del hecho de que existe una base de Hamel para \mathbb{R} , considerado como espacio vectorial sobre \mathbb{Q} , observe que \mathbb{R}^2 también puede considerarse como espacio vectorial sobre \mathbb{Q} y que, obviamente, tendrá la misma dimensión que \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} , así que son isomorfos como espacios vectoriales (corolario 4.3, capítulo 3 de [Lan]).

De aquí se deduce que \mathbb{R} y \mathbb{R}^2 son isomorfos como grupos aditivos. Además, esto no es exclusivo para $n = 2$; en realidad, el mismo método demuestra que todos los grupos \mathbb{R}^n , $n \geq 1$, son isomorfos como grupos aditivos.

Antes de adentrarnos en la teoría, veamos algo práctico sobre las bases de Hamel.

EJEMPLO 2.1. [Gro] Sea $S = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subseteq [0, 1]$ con $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ y $n \geq 3$. Consideremos las distancias entre pares de elementos de S . Si cada distancia que aparece, excepto la distancia 1, ocurre al menos dos veces, entonces S está compuesto únicamente por números racionales.

En efecto, suponga que no es así y considere a H , una base de Hamel para \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} . Entonces, para cada elemento $x_k \in S$ tenemos:

$$x_k = \sum_{i \leq m} q_{k,i} \cdot h_i,$$

donde $q_{k,i} \in \mathbb{Q}$ y $h_i \in H$, para todo $i \leq m$ (Aquí m es un natural suficientemente grande de modo que cada vector x_k , para $k \leq n$, pueda expresarse como única combinación lineal de longitud a lo más m).

Entonces, debido a la suposición, existen $h_i \notin \mathbb{Q}$ y $q_{k,i} \neq 0$. Denotemos $\Lambda = \{q_{k,i} : k \leq n\}$ y notemos que $0 \in \Lambda$, ya que $x_0 = 0$.

Definamos $\tilde{q} = \min \Lambda$ y $\hat{q} = \max \Lambda$, cumpliéndose que $\tilde{q} < \hat{q}$ (pues, de lo contrario, tendríamos $\tilde{q} = \hat{q} = 0$, lo que implicaría $\Lambda = \{0\}$, y esto sería una contradicción).

Tomemos los siguientes conjuntos:

$$\hat{X} = \{x_k : q_{k,i} = \hat{q} \wedge 0 \leq k \leq n\} \quad y \quad \check{X} = \{x_k : q_{k,i} = \tilde{q} \wedge 0 \leq k \leq n\}.$$

Sean $x \in \hat{X}$, $y \in \check{X}$. Entonces, de acuerdo con la condición inicial (ya que al menos uno no es racional), existen x_r, x_s con $0 \leq r, s \leq n$ tales que $x - y = x_r - x_s$ y $\{x, y\} \neq \{x_r, x_s\}$. Esto significa que $\hat{q} - \tilde{q} = q_{r,i} - q_{s,i}$, lo que implica $q_{r,i} = \hat{q}$ y $q_{s,i} = \tilde{q}$; es decir, $x_r \in \hat{X}$ y $x_s \in \check{X}$.

Ahora, basta tomar $x = \max \hat{X}$, $y = \min \check{X}$ y obtener una contradicción, ya que esto implica que $x_r = x$, $x_s = y$, por lo que se sigue $\{x, y\} = \{x_r, x_s\}$.

Esta sección también está dedicada a construir algunas bases de Hamel con diversos tipos de propiedades, algunas muy interesantes, como la de ser cerradas bajo potencias enteras: ¡no sólo positivas!

¹Recuerde que para un conjunto infinito A , la familia de todos los subconjuntos finitos de A se denota mediante el símbolo $[A]^{<\omega}$, y tiene el mismo tamaño que A .

TEOREMA 2.2. *Existe una base de Hamel H para \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} tal que*

$$(h \in H) \Rightarrow (\forall n \in \mathbb{Z})(h^n \in H).$$

DEMOSTRACIÓN: Primero, introduciremos alguna notación de interés. Si $M \subseteq \mathbb{R}$, $F(M)$ es el campo generado por M , $A(M)$ es el conjunto de números algebraicos sobre M . Es claro que si $|M| < \mathfrak{c}$, entonces también $|F(M)| < \mathfrak{c}$ y $|A(M)| < \mathfrak{c}$.

Sea $\mathbb{R} = \{r_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$, con $r_0 = 1$, una enumeración. Por recursión se construirán sucesiones transfinitas de números reales $\{y_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$ y $\{z_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$ con las siguientes propiedades:

Si $H_\alpha = \{y_\xi^k : k \in \mathbb{Z} \wedge \xi \leq \alpha\} \cup \{z_\xi^k : k \in \mathbb{Z} \wedge \xi \leq \alpha\}$, entonces para cada $\alpha < \mathfrak{c}$:

2.1 H_α es \mathbb{Q} -linealmente independiente,

2.2 $(\forall \xi \leq \alpha)(r_\xi \in \text{span}_{\mathbb{Q}}(H_\alpha))$.

Haga $y_0 = z_0 = 1$; entonces $H_0 = \{1\}$ satisface 2.1 y 2.2. Suponga que para $\beta < \mathfrak{c}$ se han definido $\{y_\xi : \xi < \beta\}$ y $\{z_\xi : \xi < \beta\}$ de modo que 2.1 y 2.2 se cumplen para cada $\alpha < \beta$. Sea r_γ el primer elemento tal que $r_\gamma \notin L_\beta := \text{span}_{\mathbb{Q}}(\bigcup\{H_\alpha : \alpha < \beta\})$. Por 2.2, $\beta \leq \gamma$; además, como L_β tiene tamaño menor que \mathfrak{c} , existe y_β trascendente sobre $B_\beta = F(L_\beta \cup \{r_\gamma\})$; defina $z_\beta = r_\gamma - y_\beta$. Ahora, es claro que 2.2 se cumple para H_β .

Si H_β no es \mathbb{Q} -linealmente independiente, existen $h_0, h_1, \dots, h_m \in \bigcup\{H_\alpha : \alpha < \beta\}$ y racionales $s_0, s_1, \dots, s_m \in \mathbb{Q}$; además de polinomios $p_i, q_i \in \mathbb{Q}[x]$, con $i \in \{0, 1\}$, de modo que, haciendo $y = y_\beta, z = z_\beta$, se tiene

$$(*) \quad p_0(y) + p_1(z) + q_0(1/y) + q_1(1/z) + \sum_{j=0}^m s_j h_j = 0.$$

Pongamos $k_i = \deg(q_i)$, $i \in \{0, 1\}$, y multiplique (*) por $y^{k_0} z^{k_1}$ para obtener:

$$(p_0(y) + p_1(z) + d)y^{k_0} z^{k_1} + \tilde{q}_0(y)z^{k_1} + \tilde{q}_1(z)y^{k_0} = 0,$$

donde $d \in L_\beta$; o bien²

$$z^{k_1} \tilde{q}_0(y) = -(p_0(y) + p_1(z) + d)y^{k_0} z^{k_1} - y^{k_0} \tilde{q}_1(z).$$

Note que, $\tilde{q}_0(y) \neq 0$ puesto que y es trascendente sobre $A_\beta = F(L_\beta)$; además y^{k_0} divide a $(p_0(y) + p_1(z) + d)y^{k_0} z^{k_1}$ y también divide a $y^{k_0} \tilde{q}_1(z)$, por lo que divide a su resta. Pero y^{k_0} no divide a z^{k_1} , entonces y^{k_0} divide a $\tilde{q}_0(y)$ sobre A_β . Más aún, como $\tilde{q}_0 \in \mathbb{Q}[x]$, pues $\tilde{q}_0(y) = q_0(1/y)y^{k_0}$, entonces y^{k_0} divide a \tilde{q}_0 sobre \mathbb{Q} , y como $\deg(\tilde{q}_0) \leq k_0$ se sigue que

$$\tilde{q}_0(x) = a_0 x^{k_0}.$$

donde $a_0 \in \mathbb{Q}$. Así, $q_0(x)$ es un polinomio constante.

Análogamente se obtiene que $q_1(x)$ es constante, y (*) se convierte en

$$(**) \quad p_0(y) + p_1(z) + d' = 0, \text{ con } d' \in L_\beta.$$

Como y es trascendente sobre B_β , $\deg(p_0) = \deg(p_1) = m$. Suponga que $m > 0$, y escriba

$$p_i(x) = \sum_{j=0}^m a_{i,j} x^j.$$

²Observe que \tilde{q}_i es básicamente q_i ; aunque como polinomios están "al revés".

donde $i \in \{0, 1\}$, cada $a_{i,j} \in \mathbb{Q}$, y $a_{i,m} \neq 0$. El lado izquierdo de la ecuación (**) se puede reescribir como

$$b_0 + b_1y + \dots + b_my^m.$$

con cada $b_i \in L_\beta$. Entonces, en particular se tiene que $b_{m-1} = 0$. Si $m > 1$, entonces $b_{m-1} = a_{0,m-1} \pm (mr_\gamma a_{1,m} + a_{2,m-1}) = 0$, y de esta manera, $r_\gamma \in \mathbb{Q}$, lo que es imposible. Y si $m = 1$, se tiene que $b_0 = d + a_{0,0} + a_{1,0}r_\gamma = 0$; o sea que $r_\gamma \in L_\beta$, contrario a su definición.

Así que $m = 0$, y de (*) se sigue que $\bigcup\{H_\alpha : \alpha < \beta\}$ es un subconjunto \mathbb{Q} -linealmente dependiente, contradiciendo la condición (2.1). Por tanto, H_β es \mathbb{Q} -linealmente independiente. Y de esta forma, $H = \bigcup\{H_\beta : \beta < \mathfrak{c}\}$ es una base para \mathbb{R} que cumple lo requerido. \square

Sería natural buscar bases de Hamel cerradas bajo otras operaciones aritméticas. Lamentablemente en [Mab] se muestra que no existen bases de Hamel cerradas bajo producto.

Las bases de Hamel son subconjuntos extraños de los números reales; en los siguientes resultados se verá que ellas están presentes en todo subconjunto abierto y también en los conjuntos perfectos (*id est*, cerrados sin puntos aislados). Para más información sobre subconjuntos especiales de \mathbb{R} se puede consultar [FHM] o muchas otras fuentes alternativas.

TEOREMA 2.3. *Todo subconjunto abierto no vacío de \mathbb{R} contiene una base de Hamel.*

La idea de la demostración es tomar un intervalo pequeño dentro del conjunto abierto y ajustar los elementos de una base inicial para que queden dentro de ese intervalo. Luego, se construyen nuevos conjuntos que generan todo \mathbb{R} como espacio vectorial, garantizando que la base final esté contenida en el conjunto abierto original (véase [Hig]).

Con este resultado vemos que las bases de Hamel no son subconjuntos tan raros en \mathbb{R} . De hecho, hasta conjuntos con interior vacío pueden contener una, como veremos ahora.

TEOREMA 2.4. *El conjunto de Cantor contiene una base de Hamel para \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} , y por tanto todo conjunto perfecto contiene una base de Hamel.*

DEMOSTRACIÓN: Sea \mathcal{C} el conjunto de Cantor, consistente de los números $0, 1$ y todos los $x \in (0, 1)$ cuya representación ternaria no incluye 1 o que no termina en una sucesión infinita de 2 .

Sea $x \in [0, 1]$ y considere su representación ternaria $x = (0.d_1d_2\dots)_3$. Para cada $n \in \omega$ defina:

$$a_n = \begin{cases} d_n, & \text{si } d_n \neq 1, \\ 0, & \text{si } d_n = 1, \end{cases} \quad y \quad b_n = \begin{cases} 0, & \text{si } d_n \neq 1, \\ 2, & \text{si } d_n = 1. \end{cases}$$

Sean $a, b \in [0, 1]$ tales que $a = (0.a_1a_2\dots)_3$ y $b = (0.b_1b_2\dots)_3$. Note que $a, b \in \mathcal{C}$ y además $x = a + \frac{1}{2}b$. Por lo que x se representó como una combinación \mathbb{Q} -lineal de elementos en \mathcal{C} .

Ahora considere $y \in \mathbb{R}$ y note que existe $n_0 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $y/n_0 \in [0, 1]$. Por lo anterior, existen a_y y b_y tales que $y = n_0(a_y + \frac{1}{2}b_y)$. Así, \mathcal{C} contiene una base de Hamel para \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} . \square

Se deduce inmediatamente que la base hallada en el resultado anterior es un subconjunto medible según Lebesgue. Vale preguntarse también si existirán bases de Hamel que sean conjuntos de Borel, o conjuntos analíticos. Recuerde que la σ -álgebra de Borel sobre \mathbb{R} es la mínima σ -álgebra que contiene a los intervalos abiertos, y que un subconjunto de \mathbb{R} se dice analítico si es la imagen continua de un subconjunto de Borel. Resulta que las bases de Hamel para \mathbb{R} no pueden ser conjuntos de esos dos tipos. Antes de probarlo veamos lo siguiente:

Sea H una base de Hamel para \mathbb{R} , enumerada como $H = \{h_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$ y, sin pérdida de generalidad, suponga que $h_0 = 1$. Para cada $x \in \mathbb{R}$ sea $a_\alpha(x)$ el coeficiente de h_α en su representación como combinación lineal de elementos de H . Para $r \in \mathbb{Q}$, defina

$$A_r = \{x \in \mathbb{R} : a_0(x) = r\}.$$

Note que $A_r = A_0 + r$, $A_r \cap A_s = \emptyset$ si $r \neq s$, y que $\bigcup\{A_r : r \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{R}$. Si A_0 fuera medible según Lebesgue, también lo sería cada A_r , y como $\bigcup\{A_r : r \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{R}$, al menos uno de los conjuntos A_r , y por lo tanto A_0 , debe tener medida positiva. Se sigue que el conjunto $A_0 - A_0 = \{x - y : x, y \in A_0\}$ contiene un intervalo abierto alrededor del 0 (véase [Str]). Por lo que, debido a la densidad de \mathbb{Q} , existen $x, y \in A_0$ con $x - y \neq 0$ y tales que $x - y \in \mathbb{Q}$.

Pero $a_0(x) = a_0(y) = 0$, y entonces tanto x como y son irracionales, una contradicción. Así que el conjunto A_0 no puede ser medible según Lebesgue. Con esto en cuenta, probemos el siguiente resultado:

TEOREMA 2.5. *Si H es una base de Hamel para \mathbb{R} , entonces H no puede ser un conjunto de Borel ni puede ser un conjunto analítico.*

DEMOSTRACIÓN: Sin perder generalidad, suponga que $1 \in H$. Sea $K = H \setminus \{1\}$. Para cada $n \in \omega$ y cada $\mathbf{r} \in \mathbb{Q}^{n+1}$, defina $f_{\mathbf{r}} : K^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f_{\mathbf{r}}(k_0, k_1, \dots, k_n) = \sum_{i \leq n} r_i k_i.$$

Claro que $f_{\mathbf{r}}$ es una función continua, para cada $\mathbf{r} \in \mathbb{Q}^{n+1}$. Si H es un conjunto de Borel o analítico, entonces K y K^{n+1} también lo son. Y por tanto, para cada $\mathbf{r} \in \mathbb{Q}^{n+1}$, $f_{\mathbf{r}}[K^{n+1}]$ es un conjunto analítico.

Del hecho que H es una base de Hamel, y de que $1 \notin K$, se sigue que

$$A_0 = \bigcup\{f_{\mathbf{r}}[K^{n+1}] : n \in \omega \wedge \mathbf{r} \in \mathbb{Q}^{n+1}\}.$$

Por lo que A_0 es un conjunto analítico y entonces es medible según Lebesgue, contrario a lo que se mostró anteriormente. \square

Más aún, es posible construir una partición de \mathbb{R} que consista de subconjuntos \mathbb{Q} -linealmente independientes. Esta afirmación puede encontrarse, bajo una obvia modificación, dentro de la demostración del siguiente resultado que presentamos.

TEOREMA 2.6 (Erdős-Kakutani). *CH equivale a la afirmación: Existe una familia numerable $\{H_n : n \in \omega\}$ de bases de Hamel para \mathbb{R} de modo que*

$$\bigcup\{H_n : n \in \omega\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

DEMOSTRACIÓN: Suponga primero que H es una base ordenada de Hamel para \mathbb{R} definida por $H = \{h_\alpha : \alpha < \omega_1\}$.

Para cada $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, considere su expresión única como combinación lineal

$$x = \sum_{i=0}^n q_i h_{\alpha_i},$$

donde $n \in \omega$ y $q_i \in \mathbb{Q}$ para cada $i \leq n$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\alpha_0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_n < \omega_1$.

Dado un subconjunto finito de \mathbb{Q} , $A \in [\mathbb{Q}]^{<\omega}$, suponga que $A = \{r_k : k \leq n\}$, con $n \in \omega$. Defínase al subconjunto $R_A \subseteq \mathbb{R}$ por

$$x \in R_A \Leftrightarrow x = \sum_{k=0}^n r_k h_{\alpha_k}.$$

Luego, $\mathbb{R} = \{0\} \cup \bigcup \{R_A : A \in [\mathbb{Q}]^{<\omega}\}$. Por lo que basta probar la afirmación para cada R_A . Tome cualquier $\alpha < \omega_1$, y sea $R_A^\alpha \subseteq R_A$ definido como el conjunto de todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que

$$x = r_0 h_{\alpha_0} + \dots + r_n h_{\alpha_n},$$

donde $\alpha_0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_n = \alpha_n(x) = \alpha$.

Note que, como α es numerable, sólo se pueden tomar una cantidad numerable de ordinales menores a α , por lo que R_A^α es un subconjunto numerable. Escriba $R_A^\alpha = \{x_{A,m}^\alpha : m \in \omega\}$. Para cada $m \in \omega$, defina

$$S_{A,m} = \{x_{A,m}^\alpha : \alpha < \omega_1\}.$$

Observe que el conjunto $S_{A,m}$ selecciona el m -ésimo elemento de cada R_A^α , por lo que si $x, y \in S_{A,m}$ son distintos, entonces $\alpha_n(x) \neq \alpha_n(y)$. Es claro también que $R_A = \bigcup_{m \in \omega} S_{A,m}$.

Veamos que cada conjunto $S_{A,m}$ es \mathbb{Q} -linealmente independiente.

En efecto, si $S_{A,m}$ no lo fuera, existen $k \in \omega$, $x_i \in S_{A,m}$ y $p_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, para cada $i \leq k$, tales que

$$(\circ) \quad \sum_{i \leq k} p_i x_i = 0.$$

Puesto que, para cada $i \leq k$, $x_i = r_0 h_{\alpha_{i,0}} + \dots + r_n h_{\alpha_{i,n}}$; entonces (\circ) adquiere la forma:

$$(\circ\circ) \quad \sum_{i \leq k} \sum_{j \leq n} p_i r_j h_{\alpha_{i,j}} = 0.$$

Por lo que existe $i_0 \leq k$ tal que $\alpha^* = \alpha_n(x_{i_0}) > \alpha_n(x_i)$, para cada $i \leq k$, $i \neq i_0$. Así, el término con h_{α^*} en la ecuación $(\circ\circ)$ no se cancela, pues aparece una única vez, una contradicción.

Luego para cada $S_{A,m}$ tomamos una extensión $\tilde{S}_{A,m}$ a una base de Hamel. De esta forma, cada R_A se descompone en una cantidad numerable de subconjuntos que son bases de Hamel, y en consecuencia CH implica la afirmación del enunciado.

Por el contrario, supongamos que la afirmación del enunciado es verdadera, probaremos la Hipótesis del Continuo a partir de ella. Lo haremos mostrando que, bajo la suposición, la gráfica completa de tamaño 2^{\aleph_0} es la unión de una cantidad numerable de árboles (véase teorema A.9).

Sea $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \omega} M_n$ una descomposición del conjunto de todos los números reales en una cantidad numerable de conjuntos, cada uno de los cuales consta de números

\mathbb{Q} -linealmente independientes. Podemos suponer que M_0 tiene tamaño 2^{\aleph_0} por el teorema de König (véase por ejemplo [Her], p. 245).

Sea G una gráfica completa de número cardinal 2^{\aleph_0} , la podemos tomar como sigue:

$$G = \{ \{x, y\} : x, y \in M_0 \wedge x < y \}.$$

Tomemos los siguientes conjuntos: $G_n = \{ \{x, y\} : x < y \wedge y - x \in M_n \}$. Claramente tenemos $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$. Veamos que cada G_n es un árbol, para esto supongamos que G_n contiene un polígono cerrado. Sean $x_1, \dots, x_k, x_{k+1} = x_1$ los vértices de este polígono. Entonces tenemos

$$\sum_{i=1}^k (x_i - x_{i+1}) = \sum_{i=1}^k \pm |x_i - x_{i+1}| = 0.$$

Tenemos que para cada $i \leq k$, $x_i \in M_0$ y además $|x_i - x_{i+1}| \in M_n$. Así se tiene que todos los números $|x_i - x_{i+1}|$ son distintos. Pero esto es una contradicción, ya que M_n consiste de números \mathbb{Q} -linealmente independientes. Por lo tanto, la afirmación del enunciado implica CH. \square

3. Otras bases en espacios de Banach

El conjunto de números reales no es simplemente un espacio vectorial sobre \mathbb{Q} ; por lo aprendido en cursos elementales sobre las propiedades del valor absoluto, $|\cdot|$, sabemos que de hecho él define una métrica que es completa; no llega a ser una norma completa pues \mathbb{Q} no es completo. Así, \mathbb{R} como espacio vectorial sobre \mathbb{Q} tiene estructura parecida a la de espacio de Banach. Recuerde que una *norma* en un espacio vectorial X (sobre \mathbb{R}) es una función $\|\cdot\|$ de X en \mathbb{R} tal que para cada $x \in X$, $\|x\| \geq 0$ y $\|x\| = 0$ si y sólo si x es el elemento neutro respecto de la suma en X , para todo $x \in X$ y todo $c \in F$ se cumple $\|cx\| = |c|\|x\|$, y para cualesquiera $x, y \in X$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. Es un ejercicio rutinario demostrar que toda norma sobre X induce una métrica para X . Un espacio normado que es completo (como espacio métrico) se denomina *espacio de Banach*. Cabe resaltar que en un espacio normado confluyen dos estructuras de diversa naturaleza: una algebraica, la de espacio vectorial, y una topológica como espacio métrico.

Ligando esta sección a lo que anteriormente se ha tratado, y como aplicación del bien conocido teorema de Categorías de Baire, estudiaremos la cardinalidad de una base de Hamel para un espacio de Banach.

PROPOSICIÓN 3.1. *En un espacio de Banach de dimensión infinita, ninguna base de Hamel es numerable.*

DEMOSTRACIÓN: Considere X , un espacio como en la hipótesis, y suponga que tiene una base de Hamel numerable, a saber $H = \{h_n : n \in \omega\}$.

Note que entonces $X = \bigcup_{n \in \omega} \text{span}(\{h_k : k \leq n\})$. O sea que X es la unión numerable de subespacios propios de dimensión finita.

Pero se sabe que todo subespacio propio de un espacio normado tiene interior vacío, y que los subespacios de dimensión finita de un espacio de Banach son conjuntos cerrados (teoremas 7.1.2 y 7.4.3 de [Iri]). De esta manera se tiene que X es magro, lo que es absurdo por el teorema de Baire. Así que X no tiene dimensión numerable. \square

Es interesante entonces notar que no hay espacios normados de dimensión numerable que sean completos. Fortaleceremos este primer resultado.

Note primero que X debe tener cardinalidad al menos \mathfrak{c} , pues todo espacio normado es completamente regular, por ser métrico, y es fácilmente conexo por su estructura vectorial.

PROPOSICIÓN 3.2. *Si H es una base de Hamel para X , entonces*

$$|X| = \max\{\mathfrak{c}, |H|\}.$$

DEMOSTRACIÓN: Se tiene que

$$|X| = |[\mathbb{R}]^{<\omega} \times [H]^{<\omega}| = |\mathbb{R} \times H| = \max\{\mathfrak{c}, |H|\}$$

puesto que H es una base de Hamel para X . \square

Es interesante notar que de esta proposición se desprende que los espacios clásicos: $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, ℓ_2 así como todos los ℓ_p , para $p \in [1, \infty]$, son isomorfos como espacios vectoriales.

El siguiente lema es de carácter puramente auxiliar, por lo que se omitirá su demostración, véase teorema 1.a.5 de [LT]. Recuerde que una sucesión de elementos de X es *básica* si todo elemento del subespacio cerrado generado por ella se puede representar por una única combinación lineal infinita de elementos de la sucesión.

LEMA 3.3. *Todo espacio de Banach X de dimensión infinita admite una sucesión básica.*

Se sigue inmediatamente que si una sucesión $\{x_n : n \in \omega\} \subseteq X$ es básica, entonces si $\{c_n : n \in \omega\} \subseteq \mathbb{R}$ es una sucesión cualquiera de escalares, si $\sum_{n \in \omega} c_n x_n = 0$ implica que $c_n = 0$ para cada $n \in \omega$.

Veamos un breve recordatorio para el siguiente resultado relevante. Una familia $\mathcal{I} \subseteq [\omega]^\omega$ se llama *familia independiente* si, siempre que se tengan dos subfamilias $S, T \subseteq \mathcal{I}$ finitas y disjuntas, se cumple que:

$$\left| \bigcap_{X \in S} X \setminus \bigcup_{Y \in T} Y \right| = \aleph_0.$$

Existen familias independientes de tamaño \mathfrak{c} , originalmente eso fue publicado en [FK], actualmente las familias independientes son objetos combinatorios muy útiles; en [Lop] pueden encontrarse diversos métodos de construcción.

TEOREMA 3.4. *Toda base de Hamel para un espacio de Banach de dimensión infinita X , tiene cardinalidad al menos \mathfrak{c} .*

DEMOSTRACIÓN: Suponga que $\{x_n : n \in \omega\}$ es una sucesión básica para X , sea \mathcal{I} una familia independiente de cardinalidad \mathfrak{c} y considere la función inyectiva $\zeta : \mathcal{I} \rightarrow X$ definida como

$$\zeta(Z) = \sum_{k \in \omega} \frac{\chi_Z(k)}{2^k} \cdot x_k;$$

donde χ_Z es la función característica de $Z \in \mathcal{I}$. Note que por construcción los vectores en $\{\zeta(Z) : Z \in \mathcal{I}\}$ son linealmente independientes sobre \mathbb{R} : en efecto, si se toman distintos $Z_0, \dots, Z_m \in \mathcal{I}$, entonces para cualquier $k \in \omega$ y para cada $i \leq m$ existe un $k' > k$ de modo que para todo $j \neq i$, $\chi_{Z_i}(k') \neq \chi_{Z_j}(k')$, de aquí que los vectores $\zeta(Z_0), \dots, \zeta(Z_m)$ son linealmente independientes sobre \mathbb{R} .

Para cada $y \in X$ existen únicos $h_{\alpha_0}, \dots, h_{\alpha_{n(y)}} \in H$ con $\alpha_j < \alpha_{j+1}$, y tal que $s_0, \dots, s_{n(y)} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, de modo que

$$y = \sum_{j=0}^{n(y)} s_j h_{\alpha_j}.$$

Así que la función $\varphi : X \rightarrow [\mathbb{R}]^{<\omega} \times [H]^{<\omega}$ dada por

$$\varphi(y) = \left((s_0, \dots, s_{n(y)}), (h_{\alpha_0}, \dots, h_{\alpha_{n(y)}}) \right)$$

es una biyección, y la composición $\varphi \circ \zeta : \mathcal{S} \rightarrow [\mathbb{R}]^{<\omega} \times [H]^{<\omega}$ es inyectiva. Por otro lado, ya que $|\mathcal{S}| = \mathfrak{c}$ y $|[H]^{<\omega}| < \mathfrak{c}$, por el principio de casillas existe un subconjunto infinito $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ de modo que $p_2 \circ \varphi \circ \zeta : \mathcal{C} \rightarrow [H]^{<\omega}$ es constante (p_2 denota la proyección sobre la segunda coordenada).

Así, denote por $W_0 = \langle p_2 \circ \varphi \circ \zeta[\mathcal{C}] \rangle$ el correspondiente subespacio de dimensión finita. Y dado que ζ es inyectiva, $\zeta[\mathcal{C}] \subseteq W_0$ es un conjunto infinito de vectores linealmente independientes, lo que es una contradicción. \square

Se deduce inmediatamente de estos dos previos resultados una propiedad muy útil y conveniente de las bases de Hamel en espacios de Banach de dimensión infinita.

COROLARIO 3.5. *Si H es una base de Hamel para un espacio de Banach X , entonces $|X| = |H|$.*

Continuamos esta sección con el siguiente resultado; nuevamente pone de manifiesto que el Axioma de Elección es necesario para establecer la propiedad de Baire en subconjuntos de \mathbb{R} . Recuerde que un subconjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ tiene la *propiedad de Baire* si su diferencia con un subconjunto abierto de \mathbb{R} es pequeña en el sentido de la categoría; es decir, si $X \Delta U$ es un conjunto magro para algún $U \subseteq \mathbb{R}$ que es abierto.

PROPOSICIÓN 3.6. *Si todo subconjunto de los números reales tuviera la propiedad de Baire, entonces no existe una base de Hamel para \mathbb{R} .*

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que H es una base de Hamel, y sin pérdida de generalidad $1 \in H$.

Si $\vec{q} = \langle q_0, \dots, q_n \rangle$ es una sucesión de números racionales, entonces sea:

$$A_{\vec{q}} = \left\{ x \in \mathbb{R} : (\exists \{h_1, \dots, h_n\} \subseteq H) \left(x = q_0 + \sum_{i=1}^n q_i h_i \right) \right\}.$$

Para algún $\vec{q} \in \mathbb{Q}^{<\omega}$, debe tenerse que $A_{\vec{q}}$ no es magro (de lo contrario, \mathbb{R} sería magro). Sea $U \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto abierto y no vacío, tal que $A_{\vec{q}} \Delta U$ es magro. Elija $a, b, p \in \mathbb{R}$ tal que $p \neq 0$, $a + p < b$, y $(a, b + p) \subseteq U$. Entonces $(a, b) \setminus A_{\vec{q}}$ es magro; por lo tanto, $(a + p, b + p) \setminus (A_{\vec{q}} + p)$ también es magro, donde $A_{\vec{q}} + p$ es el desplazamiento $\{x + p : x \in A_{\vec{q}}\}$.

Sin embargo, si $x \in A_{\vec{q}} \cap (A_{\vec{q}} + p)$ se tiene que $x \in A_{\vec{q}}$ y $x - p \in A_{\vec{q}}$, pero su diferencia es racional (y distinta de cero), lo que no es posible. \square

La anterior es básicamente la demostración de que un conjunto de Vitali no tiene la propiedad de Baire. Considerar la propiedad de Baire en espacios de Banach nos ofrece una forma simple de encontrar bases de Hamel que sean de cierto modo conjuntos “pequeños”.

TEOREMA 3.7. *Sea H una base de Hamel para un espacio de Banach X . Si H tiene la propiedad de Baire, entonces H es un conjunto magro.*

DEMOSTRACIÓN: Suponga que H no es magro. Entonces existe un subconjunto abierto $U \neq \emptyset$ de modo que $U \Delta H$ es magro. Claro que $U \cap H \neq \emptyset$, pues X es espacio métrico completo. Sea $z \in U \cap H$ y considere $\{x_n : n \in \omega\} \subseteq X$ una sucesión convergente a z . Sin pérdida de generalidad suponga que cada x_n necesita al menos cuatro sumandos para su representación en la base H .³

Puesto que U es abierto y $x_n \rightarrow z$, hay $j \in \omega$ tal que $(z + U) \cap (x_j + U) \neq \emptyset$. Y como $z \in U \cap H$, se sigue que $(z + H) \cap (x_j + H) \neq \emptyset$. Así, hay $v \in X$ tal que $k + h = v = x_j + h'$, donde $h, h' \in H$. Entonces $x_j = z + h - h'$, contradiciendo que H sea base. \square

La riqueza de los espacios de Banach es tal que incluso sin acudir a la propiedad de Baire se pueden obtener bases de Hamel que sean conjuntos “pequeños pero bien acomodados”. Veamos el siguiente resultado.

TEOREMA 3.8. *Existe una base de Hamel para un espacio de Banach X que es un conjunto denso y magro. Más aún, existe una base de Hamel que es un conjunto denso en ninguna parte.*

DEMOSTRACIÓN: Sea $\mathcal{B} = \{B_\alpha : \alpha < \kappa\}$ una base para la topología de X con cardinalidad mínima κ . Se construirá un subconjunto linealmente independiente $H' = \{h_\alpha : \alpha < \kappa\}$ de modo que $h_\alpha \in B_\alpha$ y $\|h_\alpha\| \in \mathbb{Q}$ para cada $\alpha < \kappa$.

Tome $h'_0 \in X$ cualquiera y considere $h_0 = h'_0 / \|h'_0\|$; puesto que existe algún $B \in \mathcal{B}$ de modo que $h_0 \in B$, sin pérdida de generalidad suponga que $B = B_0$. Asuma que para $\beta < \kappa$, ya se construyó el subconjunto linealmente independiente $H_\beta = \{h_\alpha : \alpha < \beta\}$. Ya que $\beta < \kappa$ y se sabe que $\kappa \leq |X| = \dim(X)$ (ver cap. 1, §8 de [Kun]), entonces $B_\beta \not\subseteq \text{span}(H_\beta)$, pues $\text{span}(H_\beta)$ es subespacio propio de X . Sea $h \in B_\beta \setminus \text{span}(H_\beta)$. Tome $q \in (\|h\| - \varepsilon, \|h\| + \varepsilon) \cap \mathbb{Q}$, donde $\varepsilon > 0$ es tal que $\mathbb{B}(h; \varepsilon) \subseteq B_\beta$. Entonces $h_\beta := q \cdot h / \|h\| \in B_\beta$ y $\|h_\beta\| \in \mathbb{Q}$.

Ahora, extienda H' con vectores unitarios a una base de Hamel H . Es claro que H es un subconjunto denso en X . Más aún, para cada $q \in \mathbb{Q}$, el conjunto $\{h \in H : \|h\| = q\}$ es denso en ninguna parte, pues está contenido en una esfera de radio q (que es un conjunto cerrado y con interior vacío). Se sigue que H es magro.

Luego, defina $\tilde{H} = \{h / \|h\| : h \in H\}$. Es claro que \tilde{H} es una base de Hamel para X que es densa en ninguna parte. \square

4. ¡Una base de Hamel conexa!

En esta sección veremos resultados sobre bases de Hamel para espacios de Banach. Nuestro objetivo es demostrar la existencia de bases de Hamel conexas y localmente conexas para espacios de Banach separables y de dimensión infinita. En particular esto será aplicado para establecer la existencia de bases de una sola pieza en la esfera unitaria de los espacios ℓ_p con $p \in [1, +\infty)$. Para establecer lo deseado, primero probaremos algunos resultados para X , un espacio vectorial normado sobre el campo \mathbb{R} .

Como es habitual, $o(X)$ denota la cardinalidad de todos los subconjuntos abiertos de X . Naturalmente, $\dim X \leq |X| \leq o(X)$. Si X es separable, entonces

³Dicha sucesión existe; a saber, tome una sucesión $y_n \rightarrow z$ y considere tres elementos $z_0, z_1, z_2 \in H$. Luego, $(y_n + z_0/2^n + z_1/2^n + z_2/2^n) \rightarrow z$.

$o(X) = |X| = \mathfrak{c}$ (ya que existe una base para la topología cuya cardinalidad es \mathfrak{c}). En particular, $o(X) = |X| = \dim X = \mathfrak{c}$ si X es un espacio de Banach separable y de dimensión infinita, esto por proposición 3.1.

Veamos algunos hechos básicos.

- 4.i Si el interior de $S \subseteq X$ no es vacío, entonces $\text{span}(S) = X$.
- 4.ii Si U es un subconjunto abierto no vacío y L es un subespacio lineal de X , entonces $U \setminus L$ contiene un conjunto linealmente independiente de tamaño $\text{codim } L$.

Para 4.i, observemos que si V es una bola abierta no vacía con centro en v , entonces $W = -v + V$ es una bola abierta alrededor de 0 y, por lo tanto, $\text{span}(V) = \text{span}(W) \supseteq \mathbb{R} \cdot W = X$. Es claro que 4.ii se deduce de 4.i y, además, notemos que 4.ii cubre el caso $L = X$ ya que $\text{codim } X = 0$ y \emptyset es linealmente independiente.

LEMA 4.1. *Si $U \subseteq X$ es un conjunto abierto, convexo y no vacío, y si L es un subespacio lineal de X con $\text{codim } L \geq 2$, entonces $U \setminus L$ es denso en U y conexo por caminos.*

DEMOSTRACIÓN: Sea L' cualquier complemento algebraico de L en X . Entonces, para cada $x \in X$ existe un par único $(u, v) \in L' \times L$ tal que $x = u + v$. Sean x_1 y x_2 puntos distintos en $U \setminus L$ y escribamos $x_j = u_j + v_j$ con $u_j \in L'$ y $v_j \in L$ para $j \in \{1, 2\}$. Dado que $x_1, x_2 \notin L$ tenemos que $u_1 \neq 0 \neq u_2$. Distinguiamos dos casos:

Primero, supongamos que los vectores u_1 y u_2 son linealmente independientes. Entonces, tenemos que $tu_1 + (1-t)u_2$ nunca es cero para todo $t \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, si $\ell(x, y)$ denota el segmento de línea recta que conecta $x \in X$ con $y \in X \setminus \{x\}$, se tiene que $\ell(x_1, x_2)$ es disjunto de L . Dado que U es convexo, $\ell(x_1, x_2) \subseteq U$ y, por lo tanto, $\ell(x_1, x_2)$ es un camino en $U \setminus L$ que conecta los puntos x_1 y x_2 .

En segundo lugar, supongamos que los vectores u_1 y u_2 no son linealmente independientes. Equivalentemente, $u_1 = \lambda u_2$ para algún escalar $\lambda \in \mathbb{R}$. Dado que la dimensión algebraica (posiblemente finita) del espacio vectorial L' es mayor que 1, por 4.ii podemos elegir un punto $y \in U \setminus \text{span}(L \cup \{u_1\})$.

Afirmamos que $\ell(y, x_j) \cap L = \emptyset$ para $j \in \{1, 2\}$. Entonces, dado que U es convexo, $\ell(x_1, y) \cup \ell(x_2, y)$ es un camino en $U \setminus L$ que conecta los puntos x_1 y x_2 .

Supongamos por el contrario que $\ell(y, x_j) \cap L \neq \emptyset$ para algún $j \in \{1, 2\}$. Entonces, para algún $t \in [0, 1]$, el punto $ty + (1-t)x_j$ se encuentra en L , con $y = u_3 + v_3$ para $(u_3, v_3) \in L' \times L$. Así tenemos, $(tu_3 + (1-t)u_j) + (tv_3 + (1-t)v_j) \in L$ y esto sólo es posible si $tu_3 + (1-t)u_j = 0$, pero ya que $u_j \neq 0$ observamos que $t \neq 0$ y, por lo tanto, $u_3 \in \text{span}(\{u_j\}) = \text{span}(\{u_1\}) \subseteq \text{span}(L \cup \{u_1\})$. Dado que trivialmente $v_3 \in \text{span}(L \cup \{u_1\})$, concluimos que $y = u_3 + v_3$ se encuentra en $\text{span}(L \cup \{u_1\})$ y esto no es posible.

En ambos casos, los puntos x_1 y x_2 pueden ser conectados por un camino en $U \setminus L$, lo que demuestra que $U \setminus L$ es conexo por caminos. En cuanto a la densidad, de 4.i se infiere que L no puede contener un conjunto abierto no vacío. Por lo tanto, $U \setminus L$ debe ser denso en U . \square

Ahora veamos un resultado que nos proporciona bases de Hamel conexas y localmente conexas.

TEOREMA 4.2. *Si $o(X) = |X| = \dim X$ entonces existe una familia \mathcal{H} de bases de X tal que $|\mathcal{H}| = 2^{|X|}$ y cada elemento de \mathcal{H} es un subconjunto conexo, localmente conexo y denso de X .*

DEMOSTRACIÓN: Suponga que $\dim X = |X| = \kappa$. Defina a la familia \mathcal{G} como sigue:

$$\mathcal{G} := \{G \subseteq X : (\exists U_1, U_2 \subseteq X \text{ abiertos}) (G = U_1 \setminus U_2 \wedge \dim \text{span}(G) = \kappa)\}.$$

Trivialmente, $|\mathcal{G}| \leq o(X) = \kappa$. En virtud de 4.i, cada subconjunto abierto no vacío de X y cada bola cerrada no degenerada en X pertenece a la familia \mathcal{G} . Por consiguiente, $|\mathcal{G}| = o(X) = \kappa$. Así podemos escribir $\mathcal{G} = \{G_\alpha : \alpha < \kappa\}$. Sea ρ una función de elección definida sobre los subconjuntos no vacíos de X , entonces se tiene que $\rho(S) \in S$ para cada subconjunto no vacío $S \subseteq X$.

Ahora, por recursión definimos los puntos x_α en X para todo $\alpha < \kappa$. Supongamos que para $\xi < \kappa$ ya está definido un punto x_α para cada $\alpha < \xi$. Entonces definimos el punto x_ξ por

$$x_\xi := \rho[G_\xi \setminus \text{span}(\{x_\alpha \mid \alpha < \xi\})].$$

Esta definición es correcta porque el conjunto $G_\xi \setminus \text{span}(\{x_\alpha \mid \alpha < \xi\})$ es no vacío, ya que se tiene $|\text{span}(\{x_\alpha \mid \alpha < \xi\})| < |\text{span}(G_\xi)| = |G_\xi| = \kappa$.

De esta manera obtenemos puntos x_α para cada $\alpha < \kappa$; donde $x_\alpha \neq x_\beta$ siempre que $\alpha < \beta < \kappa$. En particular, $A := \{x_\alpha \mid \alpha < \kappa\}$ es un subconjunto de X con $|A| = \kappa$. Por construcción, para cada $\xi < \kappa$, el vector x_ξ es linealmente independiente de todos los vectores x_α ($\alpha < \xi$). Por lo tanto, todo el conjunto A es linealmente independiente.

Sea K_0 el conjunto de todos los $\alpha \in \kappa$ tales que G_α es una bola abierta de X . Por supuesto, $|K_0| = \kappa$. Fijamos un vector $x_\beta \in A$ con $\beta \notin K_0$ y elegimos para cada $\alpha \in K_0$ un escalar $\lambda_\alpha \neq 0$ tal que ambos puntos x_α y $\tilde{x}_\alpha := x_\alpha + \lambda_\alpha x_\beta$ se encuentren en la bola G_α .

Sea \mathcal{F} la familia de todas las funciones de κ en X donde $f(\alpha) \in \{x_\alpha, \tilde{x}_\alpha\}$ para cada $\alpha \in K_0$ y $f(\alpha) = x_\alpha$ siempre que $\alpha \notin K_0$. Naturalmente, $|\mathcal{F}| = 2^\kappa$. Por construcción, $f(\kappa) \cap G \neq \emptyset$ para cada $G \in \mathcal{G}$ y cada $f \in \mathcal{F}$.

Es evidente que para cada $f \in \mathcal{F}$ tenemos que $\text{span}(A) = \text{span}(f[\kappa])$ y $f[\kappa]$ es una base de $\text{span}(A)$. Aplicando el lema de Zorn, podemos fijar un subconjunto Y de $X \setminus \text{span}(A)$ tal que Y sea linealmente independiente y $\text{span}(A \cup Y) = X$ (si $\text{span}(A) = X$, entonces $Y = \emptyset$). Por consiguiente, $f[\kappa] \cap Y = \emptyset$ y $f[\kappa] \cup Y$ es una base del espacio vectorial X para cada $f \in \mathcal{F}$. Trivialmente, $f[\kappa] \neq g[\kappa]$ siempre que $f, g \in \mathcal{F}$ sean distintos. Por lo tanto, podemos estar seguros de que el tamaño de $\mathcal{H} := \{f[\kappa] \cup Y : f \in \mathcal{F}\}$ es igual a $|\mathcal{F}| = 2^\kappa$.

Consideremos cualquier base $H \in \mathcal{H}$ de X . Por la definición de H , este interseca cada conjunto $G \in \mathcal{G}$ y, en particular, cada conjunto abierto no vacío. Por lo tanto, H es un subconjunto denso de X .

Veamos que H es tanto conexo como localmente conexo; notemos que X y todas las bolas abiertas en X son convexas. Por lo tanto, sólo necesitamos verificar lo siguiente.

- Sea $U \subseteq X$ convexo y abierto, entonces se tiene que $H \cap U$ es conexo.

Supongamos lo contrario, entonces existen conjuntos abiertos $U_1, U_2 \subseteq X$ tales que:

- (1) $U_1 \cap (H \cap U) \neq \emptyset, U_2 \cap (H \cap U) \neq \emptyset,$
- (2) $(H \cap U) \subseteq U_1 \cup U_2,$
- (3) $(H \cap U) \cap (U_1 \cap U_2) = \emptyset.$

Dado que H es denso en X , de la última condición inferimos que $U \cap (U_1 \cap U_2) = \emptyset$. Como U es conexo, $G := U \setminus (U_1 \cup U_2)$ no puede ser vacío. Así, $U \setminus G$ está separado

por los conjuntos abiertos no vacíos $U \cap U_1$ y $U \cap U_2$, por lo tanto, $U \setminus G$ no es conexo.

Ahora, si S es un subconjunto denso y conexo, entonces cada subconjunto del espacio que contenga a S también es conexo. Por lo tanto, el subconjunto $U \setminus \text{span}(G)$ del conjunto no conexo $U \setminus G$ no puede ser a la vez conexo y denso en U . Así, por lema 4.1, es imposible que $\text{codim span}(G) \geq 2$. Dado que $\dim X$ es infinito, de $\text{codim span}(G) < 2$ concluimos que $\dim \text{span}(G) = \dim X$ y por lo tanto G pertenece a nuestra familia \mathcal{G} . En consecuencia, $H \cap G \neq \emptyset$. Pero esto es imposible ya que $H \cap U \subseteq U_1 \cup U_2$ y $G \subseteq U$. Así obtenemos lo deseado y esto concluye la prueba. \square

Notemos que $o(\ell_p) = |\ell_p| = \dim \ell_p = \mathfrak{c}$ para $p \in [1, +\infty)$. Usando teorema 4.2, obtenemos bases de Hamel conexas, localmente conexas y densas en ℓ_p .

TEOREMA 4.3. *Si $o(X) = |X| = \dim X$, entonces existe una base de X que es un subconjunto conexo y localmente conexo de la esfera unitaria \mathbb{S}_X .*

DEMOSTRACIÓN: Sea φ la función continua que asigna $x \mapsto \|x\|^{-1} \cdot x$ de $X \setminus \{0\}$ a la esfera unitaria \mathbb{S}_X . Por lo tanto, $\varphi(S)$ es conexo siempre que S sea un subconjunto conexo de $X \setminus \{0\}$. Además, φ es una retracción (es decir, $\varphi \circ \varphi = \text{id}$) y, por lo tanto, $\varphi(S)$ es localmente conexo siempre que S sea un subconjunto localmente conexo de $X \setminus \{0\}$, aplicando [Eng] 2.4.E.(c) y 6.3.3.(d). Es evidente que φ restringida a una base H de X es inyectiva y $\varphi(H)$ también es una base de X . Por lo tanto, usando el teorema 4.2 obtenemos lo deseado. \square

Respecto a la hipótesis de este teorema, el caso $o(X) = |X| = \dim X > \mathfrak{c}$ no es trivial porque si X es un espacio de Banach de manera que la mínima cardinalidad de una base para su topología es un cardinal límite fuerte de cofinalidad numerable, κ ; entonces se sabe que $\kappa^{\aleph_0} = 2^\kappa$, véase [Jec, 5.23], y por lo tanto (véase [Eng, 4.1.H y 4.1.15]) tenemos $o(X) = 2^\kappa = \kappa^{\aleph_0} = |X| = \dim X$. Sin embargo, si $\kappa^{\aleph_0} = \kappa$ para la mínima cardinalidad de una base para la topología de X , entonces $o(X) = 2^\kappa > \kappa = \kappa^{\aleph_0} = |X| = \dim X$.

Para $\varphi(x) = \|x\|^{-1} \cdot x$ tenemos claramente que $\varphi(H_1) \neq \varphi(H_2)$ siempre que H_1 y H_2 sean bases distintas en \mathcal{H} . En consecuencia, si $o(X) = |X| = \dim X$, entonces existen $2^{|X|}$ bases de X que son subconjuntos conexos y localmente conexos de la esfera unitaria \mathbb{S}_X , además dichas bases son densas en ninguna parte.⁴

Ahora podríamos considerar cambiar las condiciones para obtener resultados similares a los anteriores, y aquí es donde entra la Hipótesis del Continuo. Si asumimos esta hipótesis y consideramos un espacio de Banach X con cardinalidad \mathfrak{c} , entonces podemos obtener una base de Hamel densa y conexa por caminos en X (véase [Mer]).

5. ... y aún hay algo por hacer sobre bases de Hamel.

Creemos que este tema es básicamente un tema elemental y muy interesante que aún tiene mucho por ofrecer. Hay multitud de preguntas que tienen que ver con consistencia e independencia relativa a esa de ZFC, ver por ejemplo [BDH] y [SWY]. Aquí incluimos algunas preguntas abiertas que no se alejan mucho de lo presentado en esta nota. Una que no hemos sido capaces de resolver es

⁴Todos los resultados anteriores fueron obtenidos de [Ku1].

PROBLEMA 5.1. *¿Qué subconjuntos de \mathbb{R} son incapaces de ser/contener bases de Hamel?*

Obviamente hay respuestas triviales, pero estamos interesados en conocer una caracterización topológica de aquellos subconjuntos que sí contienen bases de Hamel para \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} .

Por ejemplo, obviamente no puede ser un conjunto conexo o localmente conexo: ¿y subconjuntos típicos? ¿Puede una base de Hamel ser un conjunto de Bernstein o al menos cada conjunto de Bernstein sí contiene una base? En el teorema 3.7 de [BDH] se muestra que una base de Hamel no puede ser un subconjunto σ -compacto. En este mismo espíritu tenemos una pregunta planteada por Tomek Bartosziński y sus coautores,

PROBLEMA 5.2 (Bartosziński et. al.). *¿Existe un espacio de Banach en el que todas sus bases de Hamel sean magras?*

Antes, teorema 2.5, se mostró que una base de Hamel para \mathbb{R} no puede ser un conjunto analítico, pero qué tal el complemento de uno o imagen continua de un conjunto coanalítico (i.e. el complemento de un conjunto analítico):

PROBLEMA 5.3. [NS] *¿Puede una base de Hamel para \mathbb{R} sobre \mathbb{Q} ser un conjunto coanalítico o una imagen continua de un conjunto coanalítico?*

Como se ha mencionado antes, las familias independientes de subconjuntos de números naturales, así como las familias casi ajenas han resultado herramientas combinatorias muy útiles para realizar diversas construcciones. En esta misma nota hemos usado la primera clase de éstas familias para realizar construcciones de conjuntos de vectores linealmente independientes. También Bartoszyński y sus coautores plantean como su cuarta pregunta abierta: ¿Es cierto que todo espacio de Banach de cardinalidad κ admite una familia de 2^κ bases de Hamel que sean casi ajenas? En este contexto, casi ajenas significa que la intersección de dos de esas bases tiene cardinalidad menor que κ . En [Hal] se responde que no es decible en ZFC; es decir, hay modelos en los que para todo κ y todo espacio de Banach de esa cardinalidad posee una familia de 2^κ bases de Hamel casi ajenas; también hay modelos en los que para un κ hay un espacio de Banach que no tiene una familia grande de bases de Hamel casi ajenas. El concepto de casi ajeno puede ser modificado con facilidad; por ejemplo, podríamos decir que dos bases de Hamel H_0 y H_1 para un espacio X son *casi independientes* si la dimensión de $\text{span}(H_0 \cap H_1)$ es finita. Nosotros preguntamos:

PROBLEMA 5.4. *Si X es un espacio de Banach de cardinalidad κ , ¿cuál es la mínima cardinalidad de una familia \subseteq -maximal de bases de Hamel casi independientes?*

Terminaremos esta lista de preguntas con otra que es simple de plantear. En el Corolario 3.5 hemos visto que si X es un espacio de Banach y $H \subseteq X$ es una base de Hamel, entonces $|X| = |H|$. En la literatura hay varias maneras de realizar la demostración de esta propiedad; pero todas dependen de la completez y no se sabe si el resultado sigue siendo válido en una clase más amplia de espacios. Más precisamente,

PROBLEMA 5.5. [Hal] *Si H es una base de Hamel para un espacio vectorial de dimensión infinita X que es separable y completo como espacio métrico; ¿debe ser que $|H| = \mathfrak{c}$?*

Apéndice

Gráficas completas no numerables

Presentaremos un resultado importante que se ha usado anteriormente para establecer una equivalencia de CH (véase [EK]). Aunque este resultado queda fuera de nuestros intereses principales, creemos que es necesario incluirlo para completar y dar por finalizado nuestro trabajo.

Primero daremos algunas definiciones.

DEFINICIÓN A.6. Una gráfica es un par ordenado $G = (V, E)$ que comprende:

- V , un conjunto de vértices (también llamados nodos o puntos);
- $E \subseteq \{\{x, y\} \mid x, y \in V \text{ y } x \neq y\}$, un conjunto de aristas (también llamado segmento), que son pares no ordenados de vértices (es decir, una arista está asociada con dos vértices distintos).

A su vez, una gráfica G se dice completa si cada par de puntos de G está conectado por un único segmento, y una subgráfica se dice conexa si para cada par de vértices en ella existe un camino poligonal que los conecta. Dos segmentos $\{\alpha, \beta\}, \{\gamma, \delta\} \in G$ son consecutivos si $\alpha = \gamma \wedge \beta \neq \delta$ o $\beta = \delta \wedge \alpha \neq \gamma$.

DEFINICIÓN A.7. Un árbol T es una gráfica conexa que no contiene ciclos, equivalentemente G se llama un árbol si no contiene ningún polígono cerrado.

DEFINICIÓN A.8. Sea T un árbol, para cada $S \subseteq T$ conexo y algún vértice fijo α_s de un segmento en S , diremos que:

- $\{\alpha, \beta\} \in S$ tiene grado 1 si $\alpha = \alpha_s$, y si ya hemos definido hasta el grado n , entonces $\{\alpha, \beta\} \in S$ tiene grado $n+1$ si existe $\gamma < \alpha$ tal que $\{\gamma, \alpha\} \in S$ tiene grado n y $\{\alpha, \beta\}$ no tiene ya asignado un grado menor o igual a n .
- De manera análoga, $\{\alpha, \beta\} \in S$ tiene grado -1 si $\beta = \alpha_s$, y si ya hemos definido hasta el grado $-n$, entonces $\{\alpha, \beta\} \in S$ tiene grado $-(n+1)$ si existe $\beta < \gamma < \kappa$ tal que $\{\beta, \gamma\} \in S$ tiene grado $-n$ y $\{\alpha, \beta\}$ no tiene ya asignado un grado mayor o igual a $-n$.

Usaremos la notación $\deg(S, \{\alpha, \beta\})$ para denotar el grado del segmento $\{\alpha, \beta\}$ con respecto del subconjunto conexo S .

TEOREMA A.9 (Erdős-Kakutani). Una gráfica completa G de número cardinal κ (es decir, el número cardinal de los vértices es κ) puede ser separada en una cantidad numerable de árboles si y sólo si $\kappa \leq \aleph_1$.

DEMOSTRACIÓN: El resultado es claro para gráficas completas de cardinalidad a lo más numerable, entonces sólo lo probaremos para la gráfica completa de cardinalidad ω_1 . Primero probaremos que la gráfica G completa de número cardinal \aleph_1 puede ser separada en una cantidad numerable de árboles. Podemos suponer que G está representada por un sistema de segmentos

$$G = \{\{\alpha, \beta\} : \omega \leq \alpha < \beta < \omega_1\}.$$

Para cualquier $\omega \leq \beta < \omega_1$, tomemos una función biyectiva $f_\beta : \beta \rightarrow \omega$ y el siguiente conjunto $G_n = \{\{\alpha, \beta\} : f_\beta(\alpha) = n\}$, es claro que $G = \bigcup_{n \in \omega} G_n$. Además para cada G_n y $\beta < \omega_1$, existe un único $\alpha < \beta$ tal que $\{\alpha, \beta\} \in G_n$ (usando que la función f_β es biyectiva). También de esto se sigue que si α_0 es cualquiera de los nodos de G_n , entonces hay una sucesión finita $\alpha_0 > \alpha_1 > \dots > \alpha_k = \omega$ de modo

que $f_{\alpha_{i-1}}(\alpha_i) = n$, para $1 \leq i \leq k$. Por lo tanto cada G_n es un subconjunto conexo de G y así un árbol.

Para el otro caso, tomemos G la gráfica completa de número cardinal κ y $G = \bigcup_{n \in \omega} T_n$, donde cada T_n es un árbol. Podemos suponer nuevamente que G está representada por un sistema de segmentos

$$G = \{\{\alpha, \beta\} : \omega \leq \alpha < \beta < \kappa\}.$$

Considere la descomposición (no necesariamente numerable) de cada T_n en sus componentes conexas, $T_n = \bigcup_{\xi < \lambda} T_n(\xi)$; donde λ es la cantidad de componentes conexas de T_n .

Definimos los siguientes conjuntos

$$\begin{aligned} T_n^+(\xi) &= \{\{\alpha, \beta\} : \deg(T_n(\xi), \{\alpha, \beta\}) > 0\}, \\ T_n^-(\xi) &= \{\{\alpha, \beta\} : \deg(T_n(\xi), \{\alpha, \beta\}) < 0\}. \end{aligned}$$

Para esto notemos lo siguiente:

- 6.1 Cualquier par de segmentos consecutivos de la gráfica $T_n^+(\xi)$ son de la forma: $\{\alpha, \beta\}, \{\gamma, \delta\}$ con $\alpha < \beta, \gamma < \delta$ y $\beta \neq \delta$, ya que si existieran $\alpha \neq \gamma$ tal que $\{\alpha, \beta\}, \{\gamma, \beta\} \in S$ podríamos obtener caminos poligonales hacia α_s y por tanto tener un polígono en S , lo que no es posible.
- 6.2 Cualquier par de segmentos consecutivos de la gráfica $T_n^-(\xi)$ son de la forma: $\{\alpha, \beta\}, \{\gamma, \delta\}$ con $\alpha < \beta, \gamma < \delta$ y $\alpha \neq \gamma$.

Ahora definimos

$$T_n^+ = \bigcup_{\xi < \lambda} T_n^+(\xi), \quad T_n^- = \bigcup_{\xi < \lambda} T_n^-(\xi).$$

Así obtenemos una descomposición de $T_n = T_n^+ \cup T_n^-$, donde T_n^+ y T_n^- cumplen las observaciones 6.1 y 6.2 respectivamente.

De lo anterior obtenemos, $G = \bigcup_{n \in \omega} T_n^+ \cup T_n^-$.

Observamos que las siguientes observaciones se siguen de 6.1 y 6.2 respectivamente.

- 6.3 Para cualquier $\alpha < \kappa$, existe un único $\beta < \alpha$ tal que $\{\beta, \alpha\} \in T_n^+$.
- 6.4 Para cualquier $\alpha < \kappa$, existe un único $\alpha < \beta < \kappa$ tal que $\{\alpha, \beta\} \in T_n^-$.

Tomando los siguientes conjuntos,

$$T^+ = \bigcup_{n \in \omega} T_n^+, \quad T^- = \bigcup_{n \in \omega} T_n^-.$$

Notamos que satisfacen claramente las siguientes condiciones:

- 6.5 Para cualquier $\alpha < \kappa$, el conjunto de todos los $\beta < \alpha$ tal que $\{\beta, \alpha\} \in T^+$ es numerable.
- 6.6 Para cualquier $\alpha < \kappa$, el conjunto de todos los $\alpha < \beta$ tal que $\{\alpha, \beta\} \in T^-$ es numerable.

De esto se sigue fácilmente por el mismo argumento que en ([Sie], p. 9) que el número cardinal κ de todos los puntos $\alpha < \kappa$, es como máximo \aleph_1 . \square

Agradecimientos: Los autores agradecen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a su programa Verano Nicolaita durante el cual este trabajo fue realizado. Asimismo agradecemos a Carlos López Callejas y a Luis David Reyes Saenz por valiosos comentarios que nos ayudaron a mejorar la primera versión. Bien

merecido también es nuestro agradecimiento a la persona anónima que ha realizado el arbitraje de esta nota; su fino y pronto trabajo además de mejorar nuestro escrito, también permitirá que aparezca en el volumen de este año de Topología y sus Aplicaciones.

Bibliografía

- [BDH] T. Bartoszyński, et al. *On bases in Banach spaces*, Studia Mathematica **170.2**, p. 147-171; 2005.
- [EK] P. Erdős, S. Kakutani. *On non-denumerable graphs*, Bull. Amer. Math. Soc. **49** (6), p. 457-461, June 1943.
- [Eng] R. Engelking. *General Topology, revised and completed edition*, Heldermann, 1989.
- [FHM] A. Flores Ferrer, F. Hernández Hernández, C. Martínez Lázaro, L. A. Martínez Pérez, A. Torres Ayala. *Topología y sus aplicaciones 1*, Textos Científicos, BUAP, pp. 167-186, 2012.
- [FK] G. Fichtenholz, L. Kantorovitch. *Sur les opérations linéaires dans l'espace des fonctions bornées*, Studia Mathematica **5**, p. 69-98; 1935.
- [Gro] D. Grozev, *Dragomir Grozev's math blog*. <https://tinyurl.com/4bkb7rc3>
- [HH] L. Halbeisen, N. Hungerbühler. *The cardinality of Hamel Bases of Banach spaces*, East-West Journal of Mathematics **2**, p. 153-159, 2000.
- [Hal] L. Halbeisen. *Families of almost disjoint Hamel bases*, Extracta Mathematicae **20** (2005) 199-202.
- [Her] F. Hernández-Hernández. *Teoría de Conjuntos: una introducción*, Aportaciones Matemáticas **13**, Instituto de Matemáticas UNAM, 2021.
- [HI] F. Hernández-Hernández y M. Ibarra Contreras. *Introducción a la Teoría de la Medida*, Aportaciones Matemáticas **42**, Instituto de Matemáticas UNAM, 2018.
- [He1] F. Hernández-Hernández. *Curso de Topología: un enfoque conjuntista*, Aportaciones Matemáticas **43**, Instituto de Matemáticas UNAM, 2019.
- [Hig] J. S. Higdon. *A note on Hamel bases*. Tesis de maestría, University of Tennessee, 2008, https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1431&context=utk_gradthes.
- [Iri] I. L. Iribarren. *Topología de Espacios Métricos*, Limusa-Wiley, 1973.
- [Jec] T. Jech. *Set Theory*, 3rd ed., Springer, 2002.
- [Kre] E. Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*, Wiley, 1989.
- [Kub] G. Kuba. *Transfinite dimensions*, arXiv:2010.01983 [math.GM], 2020.
- [Ku1] G. Kuba. *Connected Hamel bases in Hilbert spaces*, arXiv:2402.07678 [math.FA], 2024.
- [Kun] K. Kunen, J. E. Vaughan. *Handbook of Set-Theoretic Topology*, North-Holland, 1984.
- [Lan] S. Lang. *Algebra*, Revised 3rd ed., Springer-Verlag, 2002.
- [LT] J. Lindenstrauss, L. Tzafriri. *Classical Banach Spaces I: Sequences Spaces*, Springer-Verlag, 1977.
- [Lop] C. López-Callejas. *Familias independientes: cardinalidad y estructura*, ICBI-BD-UAEH, 2018, <http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2159>.
- [Mab] R. D. Mabry. *No nontrivial Hamel basis is closed under multiplication*, Aequat. Math. **71**, p. 294-299, 2006.
- [Mer] E. H. Merryman. *An arcwise connected dense Hamel basis for Hilbert space*, Proc. Am. Math. Soc. **26** (1), pp. 126-128, 1970.
- [NS] M.G. Nadkarni, V.S. Sunder, *Hamel bases and measurability*. Mathematics Newsletter **14**, 2004.
- [PS] A. N. Parshin, R. Shafarevich. *Number Theory IV: Transcendental Numbers*, Springer, 1997.
- [Rio] A. Ríos Herrejón. *Una introducción a los espacios vectoriales de dimensión infinita*, Miscelanea Matemática **75** (2022) 71-86.
- [SWY] R. Schindler, L. Wu, L. Yu. *Hamel bases and the principle of dependent choice*, To appear, 2024.
- [Sie] W. Sierpiński. *Hypothèse du continu*, Chelsea Publishing Company, 1934.
- [Spi] M. Spivak. *Calculus*, 3rd ed., Reverté, 2014.

[Str] K. Stromberg. *An elementary proof of Steinhaus's Theorem*, Proc. Am. Math. Soc. **36** (1), 1972.

Correos electrónicos:

`chaiimath@gmail.com` (Carlos Eduardo Cervantes Tlatempa)

`alexischavez2599@gmail.com` (Alexis Chávez Cortés),

`fernando.hernandez@umich.mx` (Fernando Hernández Hernández)